


ANÉMONE BEIGE ÉVASÉE – FLARED BEIGE ANEMONE

Ptychodactis patula (Appellöf, 1893)



Diamètre total
10-30 cm




Poids
0,1-2 kg



Habitat
Benthique



Profondeur
50-1000m



Le saviez-vous ?

Quand je déploie mes longs tentacules en forme de palmes, je ressemble à une fleur sous-marine étrange. Mais je suis une chasseuse patiente qui capture tout petit organisme passant à portée du courant.

Me reconnaître



Grande anémone aux **nombreux tentacules** fins et pointus pouvant dépasser la centaine. Lorsqu'elle se contracte, son corps prend un aspect plissé et froissé caractéristique. Sa couleur varie du beige pâle au rose clair.

Biotope



Cette anémone fréquente les fonds **rocheux** profonds des eaux froides. Elle est principalement observée entre 50 et 300 m de profondeur. Elle vit fixée sur le substrat ou à proximité immédiate du fond.

Alimentation



Son régime alimentaire reste encore **mal connu**. Elle semble capturer de petits invertébrés et organismes passant à sa portée. Contrairement à de nombreuses anémones, elle peut se déplacer lentement sur le substrat à la recherche de nourriture.

Reproduction



La reproduction est **sexuée** avec émission des gamètes dans la colonne d'eau. Les larves planctoniques dérivent avant de se fixer sur un substrat adapté. Elle peut également régénérer ses tentacules en cas de dommages.

Répartition

Circumpolaire

