



BUCCIN COMMUN – WHELK

Buccinum undatum (Linnaeus, 1758)



Taille
5-10 cm




Poids
50-250 g



Habitat
Benthique



Profondeur
5-200 m



Le saviez-vous ?

Je suis le fameux bulot que l'on retrouve souvent dans les assiettes de fruits de mer... mais dans la nature, je suis surtout un charognard efficace capable de détecter une proie morte à grande distance grâce à mon odorat très développé

Me reconnaître



Ce gastéropode possède une **coquille spiralée épaisse** ornée de côtes ondulées caractéristiques. Sa couleur varie du beige au brun jaunâtre. Son pied musculeux lui permet de se déplacer lentement sur le fond marin.

Biotope



Il fréquente les fonds sableux, vaseux ou rocheux des eaux froides de l'Atlantique Nord. On le rencontre aussi bien près des **côtes** qu'au **large**. Il est particulièrement abondant dans les zones riches en matière organique.

Alimentation




C'est un **charognard** et un **prédateur** de mollusques. Grâce à un sens olfactif très développé il détecte les corps en putréfaction. Il est capable d'enserrer ses proies à l'aide de son pied, puis il insère sa lèvre externe entre les valves pour les forcer à s'ouvrir.

Reproduction



Le buccin est une espèce **gonochorique** et les sexes montrent des différences morphologiques. Le mâle possède un pénis de quelques centimètres situé dans la cavité palléale. La maturité sexuelle apparaît au bout de 4 à 5 ans. La période de reproduction donne lieu à des accouplements. La fécondation est interne. Quelques semaines après la fécondation, la femelle pond en moyenne 140 capsules. Chaque capsule contient des milliers d'œufs.

Répartition Atlantique Nord, mers sibériennes, Arctique



Sources : Doris,
Photographie/illustration : © Wikimedia Commons

