



CHABOISSEAU COMMUN – SHORTHORN SCULPIN

Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758)



Record de taille
90 cm




Record de poids
1,260 kg



Habitat
Benthique



Profondeur
0 - 400 m



Le saviez-vous ?

Lorsqu'on me sort de l'eau, je grogne ! Eh oui, le Chaboisseau peut émettre des sons surprenants lorsqu'il est stressé ou manipulé.

Me reconnaître



Tête large, ornée d'**épines** et de petits tubercules, régulièrement arrondie. Épine pré-operculaire n'atteignant pas le bord de l'opercule. Couleur assez variable, du **kaki au brun**. Robe ventrale comportant des **taches blanches**

Biotope



Espèce **benthique** occupant principalement des substrats **rocheux** partiellement recouverts de sable ou de vase, des **herbiers** de zostères et zones **algales** et également dans les estuaires (ex. Saint-Laurent, Québec) et les milieux portuaires. Distribution bathymétrique de 0 à > 400 m, mais majoritairement observée sur les côtes européennes jusqu'à environ **25 m de profondeur**.

Alimentation



Il se nourrit de **poissons** et de **crustacés**. Sa bouche large lui permet de consommer des **oursins**, des **mollusques** et des **vers** polychètes. Le chaboisseau commun est également **coprophage** ou scatophage (il se nourrit des excréments des autres animaux), en particulier à proximité des zones portuaires.

Reproduction



La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de **deux ans**. La période de reproduction s'étend de décembre à mars. La ponte est déposée sur le substrat et est défendue par le mâle. Les œufs de **2 mm** de diamètre éclosent après 5 semaines environ (et jusqu'à 3 mois dans une eau à 0° C). Après éclosion, les larves d'environ **8 mm** resteront sur le fond un certain temps et ne se préoccupent que de manger (plantes et zooplancton) et de grandir.

Répartition Atlantique Nord-Est et Ouest, Océan Arctique

