


CRACHAT D'AMIRAL – COMMON SUNSTAR

Crossaster papposus (Linnaeus, 1767)



Diamètre total
20-35 cm




Poids
0,3 - 2 kg



Habitat
Benthique



Profondeur
2 - 500 m



Me reconnaître



Grande étoile de mer possédant généralement **8 à 14 bras** disposés autour d'un disque central relativement large. Sa coloration est souvent rouge, orange ou violette avec des motifs contrastés. Son corps est recouvert de petites épines.

Biotope



Le crachat d'amiral est présent sur **tous les types de fonds**, meubles ou rocheux entre 2 et 500 mètres. Il est toutefois signalé à de plus grandes profondeurs, jusqu'à 2000 mètres.

Alimentation




C'est un **prédateur** très actif, le crachat d'amiral se nourrit de mollusques (bivalves, chitons), de cnidaires (anémones) et d'autres échinodermes : étoiles, oursins, holothuries, souvent presque aussi gros que lui.

Reproduction



La reproduction du crachat d'amiral est **sexuée** et les sexes sont séparés. Les œufs fécondés se développent en contact avec le substrat et n'ont pas de phase larvaire pélagique.

Répartition De l'Arctique à la Manche et certaines régions du Pacifique Nord



Le saviez-vous ?

Je suis une redoutable chasseuse capable de poursuivre d'autres étoiles de mer. Avec mes nombreux bras, je peux littéralement envelopper mes proies avant de commencer à les digérer !

